INFORME DE II CONGRESO IBEROAMERICANO DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA

La epidemiología y la salud pública
ante el reto de la cronicidad

Santiago de Compostela, 2-4 de septiembre de 2015

Construyendo hoy la Cali del mañana

ALCALDÍA DE CALI

II CONGRESO IBERO-AMERICANO DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA

XXXIII REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA

XVI CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA

X CONGRESO DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE EPIDEMIOLOGIA

2-4 SEPTIEMBRE DE 2015
INSTITUTO DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
www.reunionanualsec.org

Logos: SE, ISE, AEP, USC, ICGE

Text on tablets: La epidemiología y la salud pública, ante el reto de la prevención

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

CONGRESO IBERO-AMERICANO DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA

2-4 SEPTIEMBRE DE 2015
FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
www.reunionanualsee.org

SEROPREVALENCIA DE ANTICUERPOS DE IGG PARA RUBEOLA Y SARAMPIÓN EN LA POBLACIÓN DE 1 A 45 AÑOS DE CALI-COLOMBIA 2009

CONTENIDO

Alarcón Luna Liliana Enf, MSc Epidemiología. Arturo Quiroga Gabriela L. Enf, MSc Epidemiología, Secretaria de Salud Pública Municipal de Santiago De Cali, Programa Ampliado de Inmunizaciones. calisaludable@gmail.com , gaby898@gmail.com

Antecedentes: El sarampión y la Rubéola, son consideradas como enfermedades infecto-contagiosas en el mundo, a pesar de que se cuenta con una vacuna eficaz y de bajo costo, según datos de la OMS, se reportó que en el año 2012 murieron 122.000 personas por sarampión. Antes de la introducción de la vacuna antisarampionosa en Colombia, la incidencia del sarampión era de 90 casos por 100.000 habitantes. En el 2005 en Cali, gracias a las Jornadas Masivas de vacunación se logró coberturas superiores del 95%, e interrumpir la transmisión del virus. Es importante resaltar que en la ciudad de Cali no existen estudios de seroprevalencia que ayuden a determinar que la vacunación es una medida costo efectiva en la interrupción de estas enfermedades

Objetivo: Determinar si títulos de anticuerpos tipo IgG contra la Rubéola y Sarampión medidos en la población entre 1 y 45 años de Santiago de Cali durante 2009 son protectores de infección por estos virus

Métodos: Tipo de estudio: Transversal.

RESULTADOS :

Tabla 1. Caracterización Socio-demográfica población con prueba de IgG para Rubéola-IgG para Sarampión

VARIABLE	RUBEOLA (N=3110)	SARAMPIÓN (N=480)
GRUPO EDAD- N (%)		
1 A 5	104 (3,3)	21(4,4)
6 A 14	467 (15)	41 (8,5)
15 A 24	655 (21,1)	135 (28,1)
25 A 34	1027 (33)	153 (31,9)
35 A 45	857 (27,6)	130 (27,1)
GENERO N (%)		
FEMENINO	2565 (82,5)	385 (80,2)
MASCULINO	545 (17,5)	95 (19,8)
RÉGIMEN DE AFILIACIÓN		
CONTRIBUTIVO	501 (16,1)	129 (26,9)
SUBSIDIADO	522 (16,8)	250
POBRE NO ASEGURADO	2087 (67,1)	101(21)
ESTRATO		
1	245 (7,9)	38 (7,9)
2	1438 (46,2)	210 (43,8)
3	1273 (40,9)	211 (44)
MAYOR DE 4	157 (5)	21 (4)
ZONA		
CENTRO	877 (28,2)	142 (29,6)
LADERA	902 (29)	149 (31)
NORTE	650 (20,9)	99 (20,6)
ORIENTE	274 (8,8)	28 (5,8)
SURORIENTE	407 (13,1)	62 (12,9)

Tabla 2: Promedio de Protección por estado vacunal para Rubéola y Sarampión.

PROTECCIÓN_RUBEOLA				
VARIABLE	SI	NO	CHI 2	P
VACUNA	2928	64	94,749*	0
NO	98	20		
PROTECCIÓN_SARAMPIÓN				
VACUNA	465	9	188,354	0
NO	0	6	*	

Tabla 3: ANOVA de un factor para log de IgG para Rubéola y Sarampión por Grupo de Edad, Régimen de afiliación, Estrato, Zona.

VARIABLE	log de IgG para Rubéola			log de IgG para Sarampión		
	F	GL	p	F	GL	p
Grupo Edad	2,063	4,1	,083	2,497	4,1	,042
Régimen de afiliación	,825	2,1	,438	1,229	2,1	,294
Estrato	,314	3,1	,816	,608	3,1	,610
Zona	,571	4,1	,684	3,630	4,1	,006

Para el procesamiento de la ANOVA se realizó una transformación logarítmica de los títulos de IgG para rubéola y Sarampión, en esta prueba NO se encontraron diferencias en el promedio de la varianza de IgG para rubéola por edad, régimen de afiliación, estrato y zona; en la evaluación del promedio de la varianza de IgG para Sarampión por grupo de edad y zona, se observó que existen diferencias en uno de los grupos. Aunque al realizar las pruebas de Tukey y Tamhane, estas diferencias entre grupos, no fueron significativas, igualmente no se encontraron diferencias por régimen de afiliación y estrato.

Se realizó prueba de correlación de spearman entre las edad y los anticuerpos IgG para rubéola y Sarampión, en la cual se encontró un valor de p < de 0,05 (0,00), que indica que la edad están relacionada con los títulos de anticuerpos y existe linealidad entre las dos.

Tabla 4: Evaluación de Interacción-ANCOVA-Pruebas de los efectos inter-sujetos

Origen/Variable	log Rubéola		log Sarampión	
	F	p	F	p
Estado Vacunal	11,5	,001	21.5	0,0
Interacción con edad y vacuna*	,331	,565	0,745	0,388

*IgG Rubéola: R cuadrado = ,013 (R cuadrado corregido = ,012)
*IgG Sarampión: R cuadrado = ,078 (R cuadrado corregido = ,076)

GACETA SANITARIA

Vol. 29 - Especial Congreso - Septiembre 2015

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA

ISSN: 0213-9111

II CONGRESO IBEROAMERICANO DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA

XXXIII Reunión Científica
de la Sociedad Española de Epidemiología
XVI Congreso de la Sociedad Española
de Salud Pública y Administración Sanitaria

X Congresso da Associação Portuguesa de Epidemiologia
La epidemiología y la salud pública ante el reto de la cronicidad

Santiago de Compostela, 2-4 de septiembre de 2015

REVISTA ESPAÑOLA DE SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA
REVISTA ESPANYOLA DE SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA
REVISTA ESPAÑOLA DE SAÚDE PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO SANITARIA
OSASUN PUBLIKO ETA SANITAL ADMINISTRAZIOKAKO ESPAINIAR ALDIZKARIA